Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC MI Paste Plus®

TOPICAL CREME WITH CALCIUM, PHOSPHATE AND FLUORIDE

For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

DESCRIPTION
GC MI Paste Plus is a water based creme containing RECALDENT™ * with incorporated fluoride (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). The level of fluoride is 0.2% w/w (900ppm), which approximates that in adult strength toothpastes. When CPP-ACPF is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium, phosphate and fluoride.

IMPORTANT:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACPF and the flavor will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACPF and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium, phosphate and fluoride
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
Casein phosphopeptides are derived from milk casein.
Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE INDICATIONS
a. Following in-office bleaching procedures.
b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
d. Hypersensitivity prevention and control.
e. As an alternative means of applying fluoride topically in children aged 6 and above.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk caries patients.
h. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
i. For special needs adult patients.

In-office application:
I. **Custom tray application**
1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC MI Paste Plus into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (another 1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC MI Paste Plus in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. **Non tray application:**
1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply GC MI Paste Plus to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC MI Paste Plus undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At-home application:
III. **Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional**
1. Apply a sufficient amount of GC MI Paste Plus to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC MI Paste Plus.
2. Leave GC MI Paste Plus on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC MI Paste Plus throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1-2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC MI Paste Plus and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC MI Paste Plus remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVORS
Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C; 46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES
Tube containing 40g (35mL)
1. Assorted Package
   10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
2. Single Flavor Package
   10 x 40g in each flavor (Vanilla, Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint)
3. Refill Package
   1 x 40g tube in each flavor

NOTE
GC MI Paste Plus with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada and USA.

CAUTION
1. Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. It is not recommended to use GC MI Paste Plus on patients under the age of 6.
3. The overnight at home application is not recommended for children under 12.
4. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
5. In case of spillage on clothes, wash off with water.
6. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product such as a flavoring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at:
http://www.gceurope.com/

They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 11/2016

CE

Rx Only

MANUFACTURED BY
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED BY
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Research-park Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN THE USA

12

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)

GC MI Paste Plus®

Last revised: 11/2016

7311116

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! DE

GC MI Paste Plus®

CREME MIT KALZIUM, PHOSPHAT UND FLUORID

Zur Anwendung durch oder unter der Kontrolle durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die angegebenen Indikationen.

BESCHREIBUNG
GC MI Paste Plus ist eine wasserbasierte Creme, die RECALDENT™ * und eingebettes Fluorid enthält (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). Der Fluoridanteil beträgt 0,2% w/w (900ppm); das entspricht dem Durchschnittswert einer Zahnpaste für Erwachsenene. Bei der Anwendung von CPP-ACP lagert sich dieses an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxyapatiten und Weichgewebe an und gibt bioverfügbares Calzium, Phosphat und Fluorid ab.

WICHTIG
Durch Speichel wird die Wirkung der CPP-ACPF erhöht; der Geschmack fördert die Speichelbildung. Je länger CPP-ACPF und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird das Ergebnis.

GC MI Paste Plus ist eine neue Crème, die bioverfügbares Calcium und Phosphate sowie Fluorid enthält, und somit:
1. einen Extra-Schutz für die Zähne erzeugt.
2. dabei hilft, Säuren von säurebildenden Bakterien im Plaque zu neutralisieren.
3. bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund unterstützt.

GEGENANZEIGEN
Kasein-Phospho-Peptide werden aus Milchkasein gewonnen.. GC MI Paste Plus nicht bei Patienten mit Milcheiweißallergie oder einer Allergie / Sensibilisierung auf benzoathaltige Konserverungsmittel anwenden.

VERWENDUNG
INDIKATIONEN
a. Nach dem In-office-Bleaching.
b. Nach Ultraschall- oder manueller Zahnreinigung und nach Zahnwurzelbehandlungen.
c. Nach der professionellen Zahnreinigung.
d. Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensitivitäten.
e. Als alternative Methode der Fluoridierung bei Kinder ab dem 6. Lebensjahr
f. Während einer kieferortopädischen Behandlung.
g. Bei hohem Kariesrisiko.
h. Als Oberflächenschutz für Patienten, bei denen Erosionen, Xerostomia oder Sjögren's Syndrom auftreten.
i. Für Patienten mit speziellen Bedürfnissen.

Praxisanwendung:
I. **Anwendung mit individuellem Löffel**
1. Vor Gebrauch den individualisierten Löffel unter fließendem Wasser reinigen.
2. Eine großzügige Portion GC MI Paste Plus in den Löffel geben und diesen auf den Ober- und / oder Unterkiefer applizieren.
3. Den Löffel für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
4. Den Löffel entfernen.
5. Den Patienten anweisen, mit der Zunge die übriggebliebenen GC MI Paste Plus im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) die Paste im Mund behalten, ohne dieses dabei zu inhalieren oder zu verschlucken. Je länger GC MI Paste Plus und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg!
6. Beste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC MI Paste Plus löst sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.
7. Im Löffel verbleibendes GC MI Paste Plus nach der Anwendung unter laufendem Wasser ausspülen oder ausbürsten.

II. **Anwendung ohne Löffel**
1. Wenn nötig, überschüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen; es braucht jedoch nicht mit Durckluft getrocknet zu werden.
2. Eine ausreichende Menge GC MI Paste Plus mit einem Tupfer, Handschuh der in schwierigen interproximalen Situationen einen Interproximalbürste auf der Zahnoberfläche verteilen.
3. GC MI Paste Plus für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
4. Den Patienten anweisen, mit der Zunge die übriggebliebenen GC MI Paste Plus im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) den Schaum im Mund behalten, ohne diesen dabei zu inhalieren oder zu verschlucken. Je länger GC MI Paste Plus und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg!
5. Beste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC MI Paste Plus löst sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.

Heimanwendung:
III. **Tägliche Anwendung nach dem Zähneputzen, wie vomzahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen**
1. Eine ausreichende, mind. Bohnengroße Menge an GC MI Paste Plus jeweils auf er- und Unterkiefer applizieren. Mit einem sauberen Finger oder einem Wattetupfer verteilen; in schwierigen approximalen Bereichenmit einer Approximalbürste oder Zahnseide aufbringen.
2. GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
3. Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
4. Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problemlos in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

IV. **Anwendung am Abend / in der Nacht nach dem Zähneputzen, wie vom ahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen**
Anm.:
Die Anwendung über Nacht wird empfohlen für erwachsene Hochrisikopatienten, nicht aber für Kinder unter 12 Jahren!
1. Eine ausreichende, mind. Bohnengroße Menge an GC MI Paste Plusjeweils auf Ober- und Unterkiefer aufbringen. Mit einem sauberen Finger oder einem Wattetupfer verteilen; in schwierigen approximalen Bereichen mit einer Approximalbürste oder Zahnseide aufbringen.
2. GC MI Paste Plus mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
3. Anschließend das verbliebene GC MI Paste Plus mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie Möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden. Je länger GC MI Paste Plus und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
4. Reste vorsichtig ausspucken; dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC MI Paste Plus können problemlos in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

GESCHMACKSRICHTUNGEN
Erdbeere, Melone, Vanille, Mintze, Tutti-Frutti

AUFBEWAHRUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt von direktem Sonnenlicht (8-25°C; 46,4-77,0°F).
(Haltbarkeit : Zwei Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNGSGRÖSSEN
Tubeninhalt jeweils 40g (35mL)
1. Sortimentspackung
   10 x 40g (jeweils zweimal Erdbeer, Vanille, Melone, Mintze, und Tutti-Frutti)
2. Packung mit je einer Geschmacksrichtung
   10 x 40g der jew. Geschmacksrichtung (Vanille, Erdbeere, Melone, Tutti-Frutti, Minze
3. Nachfüllpackung
   1 x 40g Tube in jeder Geschmacksrichtung

ANMERKUNG
GC MI Paste Plus mit seiner speziellen CPP-ACP Formulierung wurde an The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien entwickelt.
*RECALDENT ist ein Warenzeichen unter Lizenz. Auf die CPP-ACP - Technologie sind Patente erteilt oder angemeldet in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada und den USA.

VORSICHT
1. Die Tube immer sofort nach Gebrauch verschließen; Pastenreste oder Feuchtigkeit am Tubenhals oder in der Kappe entfernen.
2. Die Anwendung an Patienten unter 6 Jahren wird nicht empfohlen.
3. Die Anwendung über Nacht wird für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen.
4. Bei Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
5. Spritzer auf der Bekleidung können mit Wasser abgewaschen werden.
6. Bei Auftreten von Symptomen eines Angioödems, das auf die Konservierungsstoffe oder andere Inhaltsstoffe von GC MI Paste Plus zurückgeführt werden könnte, ist die Behandlung sofort abzubrechen und der Patienten an einen Mediziner zu verweisen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com/

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 11/2016

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

GC MI Paste Plus®

EMULSION TOPIQUE CONTENANT DU CALCIUM, PHOSPHATE ET FLUORURE

Utilisation sous la tutelle d'un professionnel dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

DESCRIPTION
GC MI Paste Plus est un crème à base d'eau contenant du RECALDENT™ *et du fluorure (CPP-ACPF: Phosphopeptide de Caséine-Phosphate de calcium et Fluorure amorphe). Le niveau de fluorure est de 0,2% w/w (900ppm), ce que l'on trouve en général dans un dentifrice pour adulte. Lorsque CPP-ACPF est appliqué en bouche, il se colle aux biofilms, plaque, bactérie, hydroxyapatite et tissus mous localisant calcium bio-disponible, phosphate et fluorure.

IMPORTANT
La salive va améliorer l'efficacité du CPP-ACPF et le goût stimuler le flux salivaire. Plus le CPP-ACPF et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera efficace.

Une pâte topique contenant calcium, phosphate et fluorure bio disponibles :
1. Procure une meilleure protection des dents.
2. Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
3. Aide à neutraliser les attaques acides d'autres origines internes ou externes.

CONTRE-INDICATIONS
Les phosphopeptides de caséine sont dérivés de la caséine de lait de vache. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la caséine du lait de vache et /ou aux conservateurs benzoate.

MODE D'EMPLOI INDICATIONS
a. A la suite d'un traitement de blanchiment au cabinet.
b. Après un détartrage à la main ou aux ultrasons et après surfaçage radiculaire.
c. Après nettoyage dentaire professionel.
d. Prévention et contrôle de l'hypersensibilité.
e. Comme alternative à l'application de fluorure pour les enfants de plus de 6 ans.
f. Au cours d'un traitement orthodontique.
g. Pour les patients à haut risque carieux.
h. Pour soulager les patients souffrant d'érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
i. Pour patients présentant des exigences particulières.

Application au Cabinet :
I. **Application avec un porte empreinte**
1. Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
2. Appliquer une couche généreuse de GC MI Paste Plus dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
4. Retirer le porte-empreinte.
5. Demander au patient d'étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
6. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.
7. Les résidus de GC MI Paste Plus dans le porte-empreinte doivent être rincés ou brossés sous eau courante aussitôt après utilisation.

II. **Application sans porte-empreinte**
1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boulette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficile d'accès.
3. Laisser GC MI Paste Plus en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient de répartir GC MI Paste Plus restant avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
5. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Application à domicile:
II. **Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste**
1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Etaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus GC MI Paste Plus à la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qui suivent l'application.

III. **Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le praticien**
Note:
L'utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus GC MI Paste Plus à la surface se dissiperont progressivement au cours de 30 minutes qui suivent l'application.

PARFUMS
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver dans une endroit frais et sec et à l'abri des rayons de soleil (8-25°C; 46,4-77,0°F).
(Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT
Tube de 40g (35mL)
1. Conditionnement
   10x40g (2 de chaque parfum: Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti)
2. Coffret arôme unique
   10 tubes de 40g (Vanille, Fraise, Melon, Tutti-Frutti, Menthe)
3. Recharge
   1 tube de 40g de chaque parfum

NOTE
GC MI Paste Plus est une formule unique de CPP-ACP développée à l'école des Sciences dentaires de l'Université de Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT est une marque de fabrique utilisée sous licence. La technologie CPP-ACP relève de brevets d'invention enregistrés ou en cours d'homologation en Australie, NZ, Europe, Canada, et USA.

ATTENTION
1. Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte et d'humidité autour du flacon et du capuchon.
2. L'utilisation de GC MI Paste Plus n'est pas indiquée pour les patients de moins de 6 ans.
3. L'application nocturne à domicile n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.
4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
5. En cas de projection sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
6. Si le moindre symptôme d'angio-oedème est observé, il s'agit probablement d'une sensibilité ou allergie au conservateur benzoate ou de tout autre composant du produit tel que les arômes artificiels. Dès lors, cesser toute utilisation de ce produit et consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com/

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 11/2016

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. IT

GC MI Paste Plus®

CREMA PER USO TOPICO CONTENENTE CALCIO, FOSFATO E FLUORO

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista dentale o sotto la sua supervisione, nelle indicazioni raccomandate.

DESCRIZIONE
GC MI Paste Plus è una crema a base acquosa contenente RECALDENT™*con fluoro incorporato (CPP-ACPF: Caseina fosfopeptide-Calcio amorfo fluoruro fosfato). Il tenore di fluoro è 0,2% w/w (900ppm), simile a quello dei dentifrici per adulti. Quando il CPP-ACPF viene applicato in ambiente orale, si lega ai biofilm, alla placca, ai batteri, all'idrossiapatite e ai tessuti molli, localizzando il calcio, il fosfato e il fluoro biodisponibili.

AVVERTENZA
La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACPF e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACPF e della saliva e migliori saranno i risultati.

Una crema tópica que contiene Calcio Fosfato y Fluor biodisponible
1. Aporta extra protección a los dientes.
2. Ayuda a neutralizar los ácidos causados por las bacterias acidogénicas de la placa.
3. Ayuda a neutralizar los ácidos de otras fuentes de ácido internas y externas.

CONTRAINDICACIONES
Los fosfopéptidos de caseína son derivados de la caseína láctea. No use este producto en pacientes con probada o probable alergia a la proteína de la leche y/o con sensibilidad o alergia a conservantes de benzoatos.

ISTRUZIONES DE USO
INDICAZIONES
a. Corro continuación a tratamientos de blanqueamiento.
b. Tras un pulido radicular y curetaje.
c. Tras una limpieza profesional (P.T.C.).
d. Prevención y control de la hipersensibilidad.
e. Como alternativa a la aplicación tópica de Flúor en niños de 6 años o más.
f. Durante el tratamiento ortodóntico.
g. Para pacientes con alto riesgo de caries.
h. Para aportar una capa tópica en pacientes con erosión, xerostomía o síndrome de Sjögrens.
i. Para pacientes adultos con necesidades especiales.

Aplicación en la clínica:
I. **Aplicación con cubeta**
1. Antes de usar, limpie la cubeta cuidadosamente bajo agua corriente.
2. Vierta una capa generosa de GC MI Paste Plus en la cubeta y aplique en los dientes superiores y/o inferiores.
3. Deje la cubeta en la boca durante un mínimo de 3 minutos.
4. Retire la cubeta.
5. Pida al paciente que utilice la lengua para extender GC MI Paste Plus por toda la boca. Solicite al paciente que lo mantenga durante todo el tiempo posible (1- 2 minutos) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la saliva y la boca, más efectivo será el resultado.
6. Pida al paciente que expectore y si es posible que evite lavarse. Cualquier resto de GC MI Paste Plus puede dejarse para que se disipe gradualmente. Adviértale que no debe comer o beber durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.
7. La cubeta debe lavarse o cepillarse bajo agua corriente inmediatamente tras su uso para eliminar cualquier resto de GC MI Paste Plus.

II. **Aplicación sin cubeta:**
1. Si es necesario, elimine cualquier exceso de saliva en la superficie del diente con una bolita de algodón o pastilla. Sin embargo, NO es necesario secar el diente con aire comprimido.
2. Aplique suficiente cantidad de GC MI Paste Plus en la superficie del diente usando una torunda, el dedo enguantado o en áreas interproxi males de difícil acceso usar un cepillo de dientes interproximal.
3. Deje actuar GC MI Paste Plus durante al menos 3 minutos.
4. A continuación, pida al paciente que use la lengua para extender GC MI Paste Plus por toda la boca. Solicítele que lo mantenga en la boca durante todo el tiempo posible (1 – 2 minutos adicionales) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la boca, más efectivo será el resultado.
5. Pida al paciente que expectore y evite lavarse si es posible. Cualquier resto de GC MI Paste Plus puede dejarse para que se disipe gradualmente. Adviértale que no debe comer o beber durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.

Aplicación en casa:
II. **Aplicación durante el día recomendada por el profesional dental tras lavar los dientes**
1. Aplique suficiente cantidad de GC MI Paste Plus en los dientes superiores e inferiores. El mínimo requerido es una cantidad del tamaño de un guisante en cada arco. El material se debe aplicar en la superficie de los dientes usando un dedo limpio y seco o un bastoncillo de algodón. Para áreas con dificultad (entre los dientes) use un cepillo de dientes interproximal o hilo dental recubierto con GC MI Paste Plus.
2. Deje actuar GC MI Paste Plus en los dientes durante al menos 3 minutos.
3. A continuación, extienda con la lengua GC MI Paste Plus por toda la boca. Manténgalo en la boca durante todo el tiempo posible (1 – 2 minutos adicionales) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la boca, más efectivo será el resultado.
4. Expectore cuidadosamente y evite lavar si es posible. Cualquier resto de GC MI Paste Plus puede dejarse para que se disipe gradualmente. No coma ni beba durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.

III. **Aplicación recomendada por el profesional de la odontología tras lavar los dientes por la noche**
Nota:
El uso durante la noche está especialmente recomendado para pacientes adultos de alto riesgo, pero no para niños menores de 12 años.
1. Aplique suficiente cantidad de GC MI Paste Plus en los dientes superiores e inferiores. El mínimo requerido es una cantidad del tamaño de un guisante en cada arco. El material se debe aplicar en la superficie de los dientes usando un dedo limpio y seco o un bastoncillo de algodón. Para áreas con dificultad (entre los dientes) use un cepillo de dientes interproximal o hilo dental recubierto con GC MI Paste Plus.
2. Deje actuar GC MI Paste Plus en los dientes durante al menos 3 minutos.
3. A continuación, extienda con la lengua GC MI Paste Plus por toda la boca. Manténgalo en la boca durante todo el tiempo posible (1 – 2 minutos adicionales) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la boca, más efectivo será el resultado.
4. Expectore cuidadosamente y evite lavar si es posible. Cualquier resto de GC MI Paste Plus puede dejarse para que se disipe gradualmente. No coma ni beba durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.

SABORES
Fresa, Melón, Vainilla, Menta, Tutti-Frutti

ALMACENAMIENTO
Para una óptimo resultado, conserve en un lugar fresco y seco con baja humedad lejos de la luz directa del sol (8-25ºC; 46,4-77,0ºF).
(Caducidad: 2 años desde la fecha de fabricación)

PRESENTACIÓN
Cada tubo contiene 40g (35mL)
1. Assorted Package
   10 x 40g (2 unidades de cada uno de los siguientes sabores: Fresa, Melón, Vainilla, Menta y Tutti-Frutti)
2. Pack de un sólo sabor
   10 x 40g en sabor (Vainilla, Fresa, Melón, Tutti-Frutti, Menta)
3. Pack de reposición
   1 x 40g tubo de un sabor

NOTA
La fórmula única de GC MI Paste Plus con CPP-ACP ha sido desarrollada por The School of Dental Science, Universidad de Melbourne, Victoria, Australia.
* RECALDENT es una marca registrada, usada bajo la licencia de su propietario. La tecnología CPP-ACP tiene patentes afines o patentes pendientes en Australia, Nueva Zelanda, Europa Canadá, y EEUU.

PRECAUCIONES
1. Coloque siempre el tapón tras el uso y elimine cualquier residuo de la crema o cantidad alrededor de la boquilla del tubo o dentro del tapón.
2. No se recomienda el uso de GC MI Paste Plus en pacientes menores de 6 años.
3. La aplicación durante la noche en casa no se recomienda para niños menores de 12 años.
4. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua y busque atención médica.
5. En caso de contacto con la ropa, limpie con agua.
6. Si se experimentan ronchas o habones puede ser indicativo de sensibilidad o alergia a conservantes de benzoatos, o a algún otro de los componentes del producto como los agentes aromatizantes. Si algo de esto ocurriera, suspenda el tratamiento y consulte al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com/

También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión : 11/2016

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso. ES

GC MI Paste Plus®

CREMA DE USO TÓPICO CON CALCIO, FOSFATO Y FLÚOR

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

DESCRIPCIÓN
GC MI Paste Plus es una crema basada en agua que contiene RECALDENT™* con Flúor incorporado (CPP-ACPF: Fosfopéptido de caseína – fluorofosfato cálcico amorfo). El nivel de Flúor es de 0,2% en peso (900ppm), aproximadamente el mismo que en las pastas de dientes fuertes para adultos. Cuando CPP-ACPF se aplica en el medio oral, las moléculas CPP-ACP se unen a la biopelícula, placa, bacterias, hidroxiapatitas y al tejido blando, localizando el calcio, fosfato y flúor biodisponible.

IMPORTANTE:
La saliva mejora la efectividad de CPP-ACPF y el sabor ayudará a estimular el flujo salival. Cuanto más tiempo se mantenga en la boca CPP-ACPF y saliva, más efectivo será el resultado.

Una crema tópica que contiene Calcio Fosfato y Flúor biodisponible
1. Aporta extra protección a los dientes.
2. Ayuda a neutralizar los ácidos causados por las bacterias acidogénicas de la placa.
3. Ayuda a neutralizar los ácidos de otras fuentes de ácido internas y externas.

CONTRAINDICACIONES
Los fosfopéptidos de caseína son derivados de la caseína láctea. No use este producto en pacientes con probada o probable alergia a la proteína de la leche y/o con sensibilidad o alergia a conservantes de benzoatos.

INSTRUCCIONES DE USO
INDICACIONES
a. Como continuación a tratamientos de blanqueamiento.
b. Tras un pulido radicular y curetaje.
c. Tras una limpieza profesional (P.T.C.).
d. Prevención y control de la hipersensibilidad.
e. Como alternativa a la aplicación tópica de Flúor en niños de 6 años o más.
f. Durante el tratamiento ortodóntico.
g. Para pacientes con alto riesgo de caries.
h. Para aportar una capa tópica en pacientes con erosión, xerostomía o síndrome de Sjögrens.
i. Para pacientes adultos con necesidades especiales.

Aplicación en la clínica:
I. **Aplicación con cubeta**
1. Antes de usar, limpie la cubeta cuidadosamente bajo agua corriente.
2. Vierta una capa generosa de GC MI Paste Plus en la cubeta y aplique en los dientes superiores y/o inferiores.
3. Deje la cubeta en la boca durante un mínimo de 3 minutos.
4. Retire la cubeta.
5. Pida al paciente que utilice la lengua para extender GC MI Paste Plus por toda la boca. Solicite al paciente que lo mantenga durante todo el tiempo posible (1- 2 minutos) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la saliva y la boca, más efectivo será el resultado.
6. Pida al paciente que expectore y si es posible que evite lavarse. Cualquier resto de GC MI Paste Plus puede dejarse para que se disipe gradualmente. Adviértale que no debe comer o beber durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.
7. La cubeta debe lavarse o cepillarse bajo agua corriente inmediatamente tras su uso para eliminar cualquier resto de GC MI Paste Plus.

II. **Aplicación sin cubeta:**
1. Si es necesario, elimine cualquier exceso de saliva en la superficie del diente con una bolita de algodón o pastilla. Sin embargo, NO es necesario secar el diente con aire comprimido.
2. Aplique suficiente cantidad de GC MI Paste Plus en la superficie del diente usando una torunda, el dedo enguantado o en áreas interproxi males de difícil acceso usar un cepillo de dientes interproximal.
3. Deje actuar GC MI Paste Plus durante al menos 3 minutos.
4. A continuación, pida al paciente que use la lengua para extender GC MI Paste Plus por toda la boca. Solicítele que lo mantenga en la boca durante todo el tiempo posible (1 – 2 minutos adicionales) evitando expectorar o tragar. Cuanto más tiempo se mantenga GC MI Paste Plus en la boca, más efectivo será el resultado.
5. Pida al paciente que expectore y ev

Læs omhyggeligt brugsanvisningen inden brug. DA

GC MI Paste Plus®

LÅVVISKØS PASTA MED KALCIUM, FOSFAT OG FLUOR TIL LOKAL INTERORAL BRUG

Anvendes af eller under vejledning af det professionelle tandlægeteam til de anbefalede indikationer.

BESKRIVELSE
GC MI Paste Plus er en vandbaseret lavviskos pasta der indeholder RECALDENT™ *med fluor (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Fluoride Phosphate). Indholdet af fluor er 0,2% w/w (900ppm), hvilket modsvare samme styrke som i tandpasta til voksne. NÅR CPP-ACPF appliceres i oralt miljø, så binder det til biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt bløddelsvæv. Dette sker ved at pastaen binder til bio-tilgængeligt calcium, fosfat og fluor.

VIGTIGT
Spyt vil forøge effektiviteten af CPP-ACP og smagen vil stimulere spytsekretionen. Jo længere CPP-ACP og spytfyt forbliver i munden, jo bedre et resultat opnås.

Lavviskøs pasta med biologiskt tilgængelig calcium og fosfat til lokalt intraoralt brug:
1. Giver ekstra beskyttelse af tænderne.
2. Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra bakterier i plaque.
3. Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra andre interne og eksterne syreholdige kilder.

KONTRAINDIKATIONER
Casein phosphopeptid er et derivat fra mælkekasein. Anvend ikke produktet til personer med konstateret mælkeallergi eller mistænkt herfor og/eller med allergi eller følsomhed for benzoater.

BRUGSANVISNING
INDIKATIONER
a. Efter klinikbejning i klinikken.
b. Efter ultralydsbehandling, depuration eller rodbehandling.
c. Efter professionel tandrensning (P.T.C.).
d. Hypersensitivitets prævention og kontrol.
e. Som et alternativ til fluorbehandling på barn fra 6 år og opefter.
f. Under ortodontisk behandling.
g. Til patienter med høj kariesaktivitet.
h. For at age beskyttelse hos patienter der lider af xerostomi, xerostomia eller Sjögren's syndrome.
i. Til patienter med specielle behov.

Til anvendelse på klinikken:
I. **Applicering med standardske**
1. Inden brug skylles skeen under rindende vand.
2. Fyld et lag af GC MI Paste Plus i skeen og sæt den på plads i over eller undermunden.
3. Lad skeen være ufordrypet minimum 3 minutter i munden.
4. Fjern skeen.
5. Instruer patienten i at fordele resterende GC MI Paste Plus rundt i munden med tungen. Instruer også patienten om ikke at synke eller spytte ud, så lang tid som muligt (1-2 minutter). Jo længer GC MI Paste Plus og salv er i munden jo mere effektivt bliver slutresultatet.
6. Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Ydertigere rester af GC MI Paste Plus kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise eller drikke 30 minutter efter behandlingen.
7. Overskydende GC MI Paste Plus i skeen skylles væk under rindende vand.

II. **Applikation udenske**
1. Ved store mængder salv på tandfladen, så fjernes dette med en bomuldsrulle eller en pellet. Det er ikke nødvendig at tørre tænderne med komprimeret luft.
2. Applicer en tufte af mængde GC MI Paste Plus til tandfladen med en serviet, behandsket finger eller i vanskelig tilgængelige interproximale rum en interdental børste.
3. Lad GC MI Paste Plus være ufordrypret minimum 3 minutter i munden.
4. Instruer patienten i at lade tungen fordele resterende GC MI Paste Plus rundt i hele munden. Patienten instrueres også i det nødvendige i at holde spyt og mousse så lang tid som muligt (1-2 minutter) uden at synke eller spytte ud. Jo længere GC MI Paste Plus og salv er i munden, jo mere effektivt er slutresultatet.
5. Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Ydertigere rester af GC MI Paste Plus kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise og drikke før 30 minutter efter behandlingen.

Til anvendelse hjemme:
II. **Daglig applicering efter tandbørsting som anbefalet af tandlæge/tandplejer**
1. Applicer en sufficient mængde GC MI Paste Plus til tænderne i under og overmunden. Ca. 1/2 cm. pasta til henholdsvis under og overkæbe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemrumsbørste eller tandtråd påført GC MI Paste Plus.
2. Lad GC MI Paste Plus være ufordrypret minimum 3 minutter i munden.
3. Anvend tungen til at fordel overskydende GC MI Paste Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1-2 minutter) undgå at spytte pastaen ud eller synke den. Jo længere GC MI Paste Plus og salv er i munden, jo mere effektivt er slutresultatet.
4. Spyt herefter materialet ud og lad være med at skylle efter. Ydertigere rester af GC MI Paste Plus kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

SMAG
Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti

OPBEVARING
For optimalt resultat skal, opbevares i et koldt ventileret rum uden direkte sollys (8-25°C; 46,4-77,0°F).
(Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FORPAKNING
Tube met 40g (35mL)
1. Assorteret Pakning
10 x 40g tuber (2 stk. af hver Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti)
2. Pakning med en smagsvariant
10 x 40g tuber i hver af følgende smagsvarianter (Vanilje, Jordbær, Melon, Tutti-Frutti, Mint)
3. Refill Pakning
1 x 40g tube i hver smag

BEMÆRK
GC MI Paste Plus med sin unikke CPP-ACP formel er udviklet af: The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT er et varemærke og anvendes med licens. CPP-ACP teknologien er patenteret og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

BEMÆRK
1. Sæt altid hætten på efter brug og fjern overskydende pasta efter fugt rund om tubens åbning og indeni hætten.
2. Det anbefales ikke at anvende GC MI Paste Plus på børn under 6 år.
3. Anvendelse af pastaen om natten til børn under 12 år anbefales ikke.
4. I tilfælde af at materialet kommer i øjnene så skal der skylles grundigt med vand og herefter skal der søges lægehjælp.
5. Materiale der er kommet på tøj, vaskes bort med vand.
6. Hvis der opstår nogle former for angioedema symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitet/allergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er indeholdt i produktet eksempelvis smagsstofferne. I disse tilfælde, så skal anvendelse af produktet stoppes og en læge kontaktes.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejnske anvisninger som kan findes på:
http://www.gceurope.com/

De kan altid rekvirere hos dit depot.

Sidst revideret : 11/2016

Läs noggrant anvisningarna innan användning. SV

GC MI Paste Plus®

LÅGVISKÖS PASTA MED KALCIUM, FOSFAT OCH FLUOR

Används av eller under överinseende av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

BESKRIVNING
GC MI Paste Plus är en vattenbaserad lågviskös pasta som innehåller RECALDENT™ *med inkorporerad fluor (CPP-ACPF: (Kasein Fosfopeptid-Amorft Kalcium Fluoridfosfat). Fluornivån är 0,2% w/w (900ppm), vilket är likartat med tandkrämen för vuxna. När CPP-ACPF appliceras i munhålan det en mikro miljön, kommer den att binda till biofilm, plaque, bakterier, hydroxylapatit samt mjukvävnad. Det kommer i sin tur att lokalisera tillgängligt kalcium, fluorid och fosfater hos dessa substanser.

VIKTIGT
Saliv ökar effektiviteten av CPP-ACPF och smaken kommer att stimulera salivflödet. Ju längre CPP-ACPF och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare resultat.

Lågviskös pasta med biologiskt tillgängligt calcium, fosfater och fluor för lokalt intra-oralt bruk.
1. Ger extra skydd för tänderna.
2. Hjälper till att neutralisera syraattacker från bakteriema i plaque.
3. Hjälper till att neutralisera syraattacker från andra interna och externa källor innehållande syror.

KONTRAINDIKATIONER
Kasein fosfopeptid är ett derivat från mjölkkasein. Använd inte produkten till personer med konstaterat mjölkallergi eller misstänkt herför och/eller med allergi eller känslighet eller allergi mot konserveringsmedel med benzoatinnehåll.

BRUKSANVISNING
INDIKATIONER
a. Efter professionell tandblekning.
b. Efter ultraljudsbehandling, depuration eller rotplanning.
c. Efter professionell tandrengöring (P.T.C.).
d. Skydd och kontroll av hypersensibilitet.
e. Som ett alternativ för applicering av fluor på barn som är 6 år eller äldre.
f. Under ortodontisk behandling
g. För högkariesaktiva patienter.
h. För att öka skyddet hos patienter som lider av, xerostomi eller Sjögrens syndrom.
i. För patienter med speciella behov.

Professionell applicering:
I. **Applicering med standardske**
1. Skölj den vanliga skeden noggrant under rinnande vatten innan användning.
2. Tryck ut en generös mängd GC MI Paste Plus i skeden och sätt den på plats i over-och / eller underkäken.
3. Lämna skeden / skenan ostörd i munnen under minimum 3 minuter.
4. Avlägsna skeden.
5. Instruera patienten att använda tungan för att spridut ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt (1-2 minuter). Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slutresultatet.
6. Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.
7. Efter användning, skölj bort resterna av GC MI Paste Plus som kan finnas kvar i skeden under rinnande vatten.

II. **Applicering utan sked**
1. Om mödvändigt, avlägsna överskottssalv på tandytan med en bomulls- rulle eller pellet. Det är INTE nödvändigt att torrlägga tänderna med tryckluft.
2. Applicera en lämplig mängd GC MI Paste Plus på tandytan genom att använda ett lämpligt appliceringsverktyg, handskbeklätt finger eller en interdentalborste i approximala utrymmen där det är svårt att komma åt.
3. Lämna GC MI Paste Plus ostörd i munnen under minimum 3 minuter.
4. Instruera patienten att använda tungan för att spridut ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt det (1-2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slutresultatet.
5. Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

Hemmabruk:
II. **Daglig applicering efter tandborstning på rekommendation av tandläkare**
1. Applicera en lämplig mängd GC MI Paste Plus på tänderna i både over- och underkäke. En ärtas storlek rekommenderas för varje käke. Materialet appliceras på tandytan med ett rent tort finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tänderna) används en mellanrumsborste eller tandtråd täckt med GC MI Paste Plus.
2. Lämna GC MI Paste Plus ostörd i munnen under minimum 3 minuter.
3. Använd tungan för att spridut ut återstående GC MI Paste Plus i hela munnen. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1-2 minuter) och undvik att spotta ut. Ju längre GC MI Paste Plus och saliv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir slutresultatet.
4. Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC MI Paste Plus kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna.
Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

SMAKER
Jordgubb, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti

FÖRVARING
För optimala resultat, förvaras på en sval och torr plats med låg luftfuktighet.
Förvaras inte i direct solljus (8-25°C, 46,4-77,0°F).
(Lagringstid : 2 år från tillverkningsdatum)

FÖRPACKNINGAR
Tub innehållande 40g (35mL)
1. Sorterad förpackning
10 x 40g tuber (2 st av verdera Jordgubb, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti)
2. Förpackning med en smakvariant
10 x 40g tuber av en smak (Vanilj, Jordgubbe, Melon, Tutti-Frutti, Mint)
3. Refillförpackning
1 x 40g tub i varje smak

NOTERA
GC MI Paste Plus med dess unika CPP-ACP formula utvecklades på The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT är ett varumärke och används med licens. CPP-ACP teknologin är patenterat eller har eller patentsökts i Australien, Nya Zealand, Europa, Kanada, och USA.

VIKTIGT
1. Avlägsna eventuellt spill runt tubens öppning eller på insidan av hatten och skruva sedan på hatten direkt efter användning.
2. Använd ej MI Paste Plus på patienter under 6 år.
3. Applicering under natten rekommenderas ej till patienter under 12 år.
4. Ifall ogonkontakt skulle uppkomma, skölja omedelbart med vatten och uppsök läkare.
5. Ifall nedstänkta kläder, tvätta bort med vatten.
6. Om några symptom med angioödem uppträder kan det indikera känslighet eller allergi mot mot konserveringsmedlet som används, eller mot några andra komponenter i produkten såsom något smaksättningsämne. Om så sker avbryt användning av produkten och remittera till läkare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, hålll ar alltid uppdaterade med vära aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;
http://www.gceurope.com/

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Reviderad senast : 11/2016

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. PT

GC MI Paste Plus®

CREME TÓPICO COM CÁLCIO, FOSFATO E FLÚOR

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

DESCRIÇÃO
O GC MI Paste Plus é um creme aquoso que contém RECALDENT™ *com fluor incorporado (CPP-ACPF: Fosfopeptídeo de Caseína-Fosfato de Cálcio Amorfo e Fluor). O teor de fluor é de 0,2% p/p (900ppm), aproximadamente igual ao teor em pastas dentífricas para adultos. Ao ser aplicado no ambiente oral, o CPP-ACPF liga-se a biofilmes, à placa dentária, a bactérias, à hidroxiapatite e ao tecido mole, localizando o cálcio, fosfato e fluor biodisponíveis.

IMPORTANTE :
A saliva aumenta a eficácia do CPP-ACPF e o sabor ajuda a estimular a produção de saliva. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACPF e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Pasta tópica contendo cálcio, fosfato e fluor biodisponíveis
1. Fornece protecção extra aos dentes.
2. Ajuda a neutralizar as agressões dos ácidos produzidos pelas bactérias acidogénicas na placa bacteriana.
3. Ajuda a neutralizar as agressões dos ácidos de outras fontes internas e externas.

CONTRA-INDICAÇÕES
Os fosfopeptídeos de caseína são derivados da caseína do leite. NÃO utilize este medicamento em doentes com suspeita de ou alergia comprovada à proteína do leite e/ou que apresentem sensibilidade ou alergia a conservantes à base de benzoato.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INDICAÇÕES
a. Após procedimentos no consultório.
b. Após a destartarização ultrassónica, a curetagem ou o alisamento radicular.
c. Após a limpeza profissional dos dentes.
d. Prevenção e controlo da hipersensibilidade dentária.
e. Forma alternativa de aplicação tópica de flúor em crianças com mais de 6 anos de idade.
f. Durante o tratamento ortodôntico.
g. Para doentes com alto risco de desenvolver lesões de cárie.
h. Para proveniencar um revestimento tópico em doentes que sofram de erosão dentária, xerostomia ou síndroma de Sjögren.
i. Em doentes adultos com necessidades especiais.

Aplicação no consultório:
I. **Aplicação com moldeira individual**
1. Antes de utilizar, lave bem a moldeira individual com água corrente.
2. Esprema uma camada generosa de GC MI Paste Plus sobre a moldeira e aplique aos dentes superiores e/ou inferiores.
3. Mantenha a moldeira na boca durante pelo menos 3 minutos.
4. Retire a moldeira.
5. Diga ao doente que use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Diga ao doente que mantenha a pasta na boca o máximo tempo possível (mais 1- 2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
6. Peça ao doente para cuspir bem e, se possível, evitar lavar com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.
7. Os resíduos de GC MI Pasta Plus na moldeira devem ser lavados ou escovados sob água corrente imediatamente após a utilização.

II. **Aplicação sem moldeira:**
1. Se necessário, elimine o excesso de saliva na superfície dos dentes com um rolo ou bola de algodão. Mas NÃO é necessário secar os dentes com ar comprimido.
2. Aplique o GC MI Pasta Plus num pincel, luva de dedo/dedeira, com uma zaragatoa de aplicação, com o dedo enluvado ou, em zonas interproximais difíceis, com uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC MI Pasta Plus.
2. Mantenha assim o GC MI Pasta Plus nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
3. Depois, use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos) evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo o GC MI Pasta Plus e a saliva se mantiverem na boca, mais eficaz é o resultado.
4. Peça ao doente para cuspir bem e, se possível, evitar lavar com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC MI Pasta Plus que reste na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.

Aplicação em casa:
II. **Aplicação durante o dia após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário**
1. Aplique uma quantidade suficiente de GC MI Pasta Plus aos dentes superiores e inferiores. É necessária pelo menos uma quantidade de tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado às superfícies dentárias com um dedo limpo e seco ou com um cotonete de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC MI Pasta Plus.
2. Mantenha assim o GC MI Pasta Plus nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
3. Depois, use a língua para espalhar o GC MI Pasta Plus restante na boca. Mantenha no produto na boca o máximo tempo possível (mais 1-2 minutos), evitando cuspir e engolir.

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

GC MI Paste Plus®

ΚΡΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΟ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η πάστα GC MI Paste Plus είναι μία πάστα με βάση το νερό που περιέχει RECALDENT™ * με ενσωματωμένο φθόριο (CPP-ACPF: Φωσφοπεπτίδιο της καζεΐνης: άμορφο φωσφορικό ιδροειδύο ασβέστιο). Το επίπεδο φθορίου είναι 0,2% κ.β (900ppm), που πλησιάζει την περιεκτικότητα αυτού στις οδοντόκρεμες ενήλικων. Όταν εφαρμόζεται το CPP-ACPF σε στοματικό περιβάλλον, τροποποιάται σε βιομύκες, πλάκα, βακτήρια, υδροχυλαπατίτη και μαλακούς ιστούς συγκεντρώνοντας το βιο-διαθέσιμο ασβέστιο, φώσφορο και φθόριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
Το σάλιο επιταχύνει την αποτελεσματικότητα του CPP-ACPF και η ιδιαίτερη γεύση του συντελεί στην διέγερση παραγωγής σάλιου. Όσο περισσότερο παραμένει το CPP-ACPF και το σάλιο στο στόμα, τόσο σημαντικότερο το αποτέλεσμα.

Πάστα τοπικής εφαρμογής που περιέχει βιοδιαθέσιμο ασβέστιο, φώσφορο και φθόριο
1. Προσφέρει επιπρόσθετη προστασία στα δόντια.
2. Συντελεί στην ουδετεροποίηση των όξινων επιθέσεων των βακτηρών της οδοντικής πλάκας που παράγουν οξέα.
3. Συντελεί στην ουδετεροποίηση των όξινων επιθέσεων από άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές παραγωγής οξέων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τα φωσφοπεπτίδια της καζεΐνης προέρχονται από την καζεΐνη του γάλατος. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ασθενείς με αποδεδειγμένη ή υποπτιαζόμενο αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλατος καιή υπερευαισθησία ή αλλεργία σε συντηρητικά με βενζοϊκό υποπροϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
α. Μετά τη διαδικασία λεύκανσης στο ιατρείο.
β. Μετά τη θεραπεία με υσκική υπερήχων, απορρύψωση ή ριζική απόξεση με εργαλεία χειρός.
γ. Μετά από επαγγελματικά καθαρισμό των δοντιών.
δ. Για πρόληψη και έλεγχο της υπερευαισθησίας.
ε. Ως εναλλακτική θεραπεία στην τοπική εφαρμογή φθορίου σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και μεγαλύτερα.
στ. Κατά τη διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας.
ζ. Σε ασθενείς υψηλού τερηδονικού κινδύνου.
η. Για τη δημιουργία τοπικού στρώματος επικάλυψης σε ασθενείς με διαβρώσεις, ξηροστομία ή σύνδρομο Sjögren.
θ. Σε ενήλικους ασθενείς με ειδικές ανάγκες.

Εφαρμογή στο ιατρείο:
I. **Εφαρμογή με προκατασκευασμένο δοκάριο**
1. Πριν από τη χρήση ξεπλύνετε καλά το δοκάριο κάτω από τρεχούμενο νερό.
2. Εξωθήστε ικανοποιητική ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στο δοκάριο και τοποθετήστε το στον άνω καλή κάτω οδοντικό φραγμό.
3. Αφήστε το δοκάριο στη θέση του χωρίς ενόχληση για ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 λεπτών.
4. Αφαιρέστε το δοκάριο.
5. Συμβουλεύστε τον ασθενή να διασκορπίσει την ενσταμένουσα ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus με τη βοήθεια της γλώσσας του για όλο το στόμα. Συμβουλεύστε τον ασθενή να παραμείνει χωρίς να φτύσει ή καθυστερώντας την κατάποση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον άλλα 1-2 λεπτά). Όσο περισσότερο παραμείνει η πάστα GC MI Paste Plus και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποδοτικότερη η διαδικασία.
6. Ζητήστε από τον ασθενή να φτύσει επιτομάνα και αν είναι δυνατόν να αποφύγει την έκπλυση του στόματος. Ενσταμένουσα ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να παραμείνει για να διαλυθεί σταδιακά. Συμβουλεύστε τον ασθενή να μην φάει ή πιεί για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.
7. Ενσταμένουσα ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να πιεζουν ή ενοχλεί τον ασθενή. Σε αυτή τη περίπτωση αυτή διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

II. **Εφαρμογή χωρίς δοκάριο:**
1. Αν κρίνεται αναγκαίο, αφαιρέστε την πιθανή περίσσεια σάλιου από τις οδοντικές επιφάνειες με τολύπα βάμβακος ή γάζα. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να στεγνώσετε υπερβολικά τα δόντια φυσώντας με την αναπνοή.
2. Εφαρμόστε την πάστα GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες με ένα ταμπόν εφαρμογής, με το δάχτυλο φορεμένο γάντι ή με δυστηρόπτες μεσοδόντιες περιοχές χρησιμοποιώντας μεσοδόντιο βουρτσάκι καθαρισμού.
3. Αφήστε την πάστα GC MI Paste Plus χωρίς ενόχληση για τουλάχιστον 3 λεπτά.
4. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας για να διασκορπίσετε την ενσταμένουσα ποσότητα GC MI Paste Plus σε όλο το στόμα. Κρατήστε την στο στόμα χωρίς να φτύσετε ή καθυστερώντας την κατάποση όσο είναι δυνατόν (για τουλάχιστον άλλα 1-2 λεπτά). Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμείνει η πάστα GC MI Paste Plus και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
5. Στη συνέχεια φτύστε επιτομάνα και αν είναι δυνατόν αποφύγετε την έκπλυση του στόματος. Ενσταμένουσα ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να παραμείνει μέχρι να διαλυθεί σταδιακά. Μην φάτε ή πιείτε σιδήποτε για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Εφαρμογή στο σπίτι:
III. **Εφαρμογή την ημέρα μετά το βούρτσισμα των δοντιών όπως προτείνεται από τον οδοντίατρο**
1. Τοποθέτηστε ικανοποιητική ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στα άνω και κάτω δόντια. Η μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα πάστας για κάθε φραγμό πρέπει να είναι μεγέθους μπιζελιού. Το υλικό θα πρέπει να εφαρμοστεί στις οδοντικές επιφάνειες με κάβρδό και στεγνό δάχτυλο ή πιπέτα. Για δυστρόπτες περιοχές χρησιμοποιήστε μεσοδόντιο βουρτσάκι καθαρισμού ή οδοντικό νήμα που έχετε προηγουμένως εμβαπτίσει στην πάστα GC MI Paste Plus.
2. Αφήστε την πάστα GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες για τουλάχιστον 3 λεπτά.
3. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας για να διασκορπίσετε την ενσταμένουσα ποσότητα GC MI Paste Plus σε όλο το στόμα. Κρατήστε την στο στόμα χωρίς να φτύσετε ή καθυστερώντας την κατάποση όσο είναι δυνατόν (για τουλάχιστον άλλα 1-2 λεπτά). Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμείνει η πάστα GC MI Paste Plus και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
4. Στη συνέχεια φτύστε επιτομάνα και αν είναι δυνατόν αποφύγετε την έκπλυση του στόματος. Ενσταμένουσα ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να παραμείνει μέχρι να διαλυθεί σταδιακά. Μην φάτε ή πιείτε σιδήποτε για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Εφαρμογή στο σπίτι:
IV. **Εφαρμογή μία φορά μετά το βούρτσισμα των δοντιών όπως προτείνεται από τον οδοντίατρο**
Τοποθέτηστε ικανοποιητική ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στα άνω και κάτω δόντια. Ποσότητα μπιζελιού για κάθε οδοντικό τόξο είναι η ελάχιστη απαιτούμενη. Το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί στις οδοντικές επιφάνειες με καθαρό δάχτυλο ή πιπέτα. Για δυστρόπτες περιοχές (ανάμεσα στα δόντια) χρησιμοποιήστε ένα καβαρό μεσοδόντιο βουρτσάκι ή οδοντικό νήμα εμπαπτισμένο σε πάστα GC MI Paste Plus.
2. Αφήστε την πάστα GC MI Paste Plus στα δόντια χωρίς ενόχληση για ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 λεπτά.
3. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γλώσσα για να διασκορπίσετε σε όλο το στόμα την υπόλοιπη ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus. Κρατήστε τη πάστα στο στόμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (για επιπλέον 1-2 λεπτά) αποφεύγοντας την απόχαμψιμη (φτύσιμο) και καθυστερώντας την κατάποση. Όσο περισσότερο παραμένει η πάστα GC MI Paste Plus και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποδοτικότερη η διαδικασία.
4. Συνέπεια η κολή απόχαμψιμη και αν είναι δυνατόν αποφύγετε το ξέπλυμα. Κάθε υπολειπόμενη ποσότητα πάστας GC MI Paste Plus στις οδοντικές επιφάνειες μπορεί να αφεθεί ώστε να διαλυθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μην φάτε ή πιείτε για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

ΓΕΥΣΕΙΣ
Φράουλα, Πεπόνι, Βανίλια, Μέντα, Τυτti-Frutti

ΦΥΑΣΞΗ
Για ιδανική απόδοση, φυλάξτε το υλικό σε δροσερό μέρος και ξηρό μέρος μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως (8-25°C; 46,4-77,0°F).
(Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Το σωληνάριο περιέχει 40g (35mL)
1. Ολοκληρωμένη συσκευασία
10 x 40g (2 από κάθε γεύση Φράουλα, Πεπόνι, Βανίλια, Μέντα, Τυτti-Frutti)
2. Συσκευασία μίας γεύσης
10 x 40g από κάθε γεύση Βανίλια, Φράουλα, Πεπόνι, Τυτti-Frutti, Μέντα
3. Ανταλλακτική συσκευασία
Σωληνάριο 1 x 40g σε κάθε γεύση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Πάστα GC MI Paste Plus με τη μοναδική σύνθεση CPP-ACP σχεδιάστηκε στο: The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT : σήμα κατατεθέν χρησιμοποιούμενο μετά από άδεια. Η τεχνολογία CPP-ACP έχει συνοδευτικές πατέντες χρήσης στην Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ευρώπη, Καναδά και Η.Π.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Επανατοποθετήστε το καπάκι στη θέση του μετά τη χρήση και αφαιρέστε κάθε υπολείπόμενη ποσότητα πάστας ή υγροσίας γύρω από το λαιμό του σωληναρίου ή μέσα από το καπάκι.
2. Δεν συστήνεται η χρήση του GC MI Paste Plus σε ασθενείς κάτω των 6 ετών.
3. Η ολονύχτια εφαρμογή του υλικού στο στόμα δεν συστήνεται για παιδιά κάτω των 12 ετών.
4. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστεστε ιατρική συμβουλή.
5. Σε περίπτωση που το υλικό πέσει σε ρούχα, ξεπλύνετε τα με νερό.
6. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα αγγειοοιδήματος, αυτό μπορεί να σημαίνει υπερευαισθησία ή αλλεργία σε βενζοϊκά παράγωγα, ή σε κάποιο άλλο συστατό του προϊόντος όπως ο παράγοντας δημιουργίας της ιδιάτερης γεύσης. Στην περίπτωση αυτή διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εχέοκειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση:
http://www.gceurope.com/

Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 11/2016

Tärkeää:Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI

GC MI Paste Plus®

PINNALLE ANNOSTELTAVA TAHNA, JOKA SISÄLTÄÄ KALSIUMIA,FOSFAATTIA JA FLUORIDIA

Vain hammashoitoalan ammattilaisten käyttöön suositeltuihin indikaatioihin.

KUVAUS
GC MI Paste Plus on vesipohjainen pasta, joka sisältää RECALDENT™* sekä fluoridia (CPP-ACPF: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride). Fluorin määrä on 0,2% w/w (900ppm), mikä vastaa aikuisten vahvan hammastahnan pitoisuutta. Kun CPP-ACPF annostellaan suuhun, se sitoutuu biofilmiin, plakkiin, bakteeriin hydroksiapatiittiin ja pehmeisiin kudoksiin paikallisteen biologisesti saatavilla olevaa kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia.

TÄRKEÄÄ:
Syliki parantaa CPP-ACPF:n tehoa, ja makuaromi stimuloi syljen eritystä. Mitä kauemmin CPP-ACPF ja syliki vaikutavat yhdessä suussa, sitä parempi on lopputulos.

Pinnalle annosteltava pasta, joka sisältää kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia
1. Tarjoaa lisäsuojaa hampaille
2. Auttaa neutralisoimaan happoa tuottavien bakteerien ja plakin aiheuttamaa uhkaa
3. Auttaa neutralisoimaan muista sisäisistä lähteistä sekä ulkopuolelta tulevaa happamuutta

KONTRAINDIKAATIOT
Casein fosfopeptidit ovat peräisin maidon kaseiinista. Älä käytä tätä tuotetta potilaille, joilla on todettu tai epäilty maitoproteiiniallergia jaitai herkistyminen tai allergia benzoaatti-säilöntäaineille.

KÄYTTÖINDIKAATIOT
a. Vastaanotolla suoritetun valkaisun jälkeen.
b. Koneellisesti tai käsintehdyn hammaskiven poiston ja juuripintojen tasoituksen jälkeen.
c. Ammattimaisen hampaiston puhdistuksen jälkeen.
d. Hypersensitiivisyyden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
e. Vaihtoehtoinen tapa annostella fluoria pinnallisesti yli 6-vuotiaille.
f. Oikomishoidon aikana.
g. Kariesken riskipotilaille.
h. Pinnallisena suojana potilaille, jotka kärsivät eroosiosta, xerostomiasta tai